ПОДГОТОВКА К ГАСТРОСКОПИИ

Если процедура в первой половине дня (до 12:00):

- Кушать **можно** не позднее чем за 4 часа до сна перед днём приёма;
- Пить в день приёма **нельзя**.

Если процедура во второй половине дня (после 12:00):

- Утром **разрешается** лёгкий перекус (не позднее 6 часов до процедуры);
- Пить за 3 часа до приёма **нельзя**!

Информация для пациента

1. Рекомендуется отказаться от приема прозрачных жидкостей за 2 ч, молока и легкой пищи за 6 ч до начала диагностической ЭГДС.

2. В рамках подготовки к колоноскопии пациентам следует закончить прием пищи перед приемом препарата для очистки кишечника и ограничить питье непрозрачных жидкостей за сутки до начала исследования.

3. Продолжить прием прозрачной углеводной жидкости вплоть до 2 часов до диагностической ЭГДС и колоноскопии.

4. Выписка после эндоскопического исследования с седацией в возрасте старше 60 лет и наличием сопутствующих заболеваний возможна только при условии сопровождения ответственным лицом.

5. В течение 24 часов не рекомендуется управлять транспортным средством, употреблять алкоголь, заниматься тяжелым физическим трудом и принимать юридических обязательств (в возрасте старше 60 лет и наличием сопутствующих заболеваний).

6. В течение 6 часов не рекомендуется управлять транспортным средством, употреблять алкоголь, заниматься тяжелым физическим трудом и принимать юридических обязательств (здоровые пациенты).

7. В случае возникновения осложнений (боль в области живота, кровотечение из заднего прохода, тошнота, рвота и т.д.) после выписки домой, необходимо связаться с врачом эндоскопистом и/или анестезиологом.

8. В случае неэффективности рекомендаций врача (продолжающееся кровотечение, выраженный болевой синдром в области живота и т.д.) рекомендуется вызвать скорую медицинскую помощь.

9. С собой в клинику необходимо взять медицинскую документацию (амбулаторная карта, данные лабораторных и инструментальных обследований, плёнки ЭКГ) а также обладать информацией о принимаемых лекарственных средствах (их названия, дозировки и режим приёма).